

インフリキシマブ療法

免疫調節剤(関節リウマチ、潰瘍性大腸炎等)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—
レミケード (インフリキシマブ)	3~10mg/kg	点滴静注(2時間)	●				

*1クール28~56日間

インフリキシマブ療法(バイオミラ)

免疫調節剤(関節リウマチ、潰瘍性大腸炎等)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—
インフリキシマブ	3~10mg/kg	点滴静注(2時間)	●				

※先発品のレミケードと適応が異なるので注意(川崎病など)

*1クール28~56日間

ベドリズマブ療法

免疫調節剤(潰瘍性大腸炎等)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—
エンタイピオ (ベドリズマブ)	300mg/body	点滴静注(30分間)	●				

※初回投与後、2週、6週に投与し、以降8週間隔で投与
2020.11

エンドキサン(シクロホスファミド)療法

免疫調節剤(リウマチ性疾患)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	—
エンドキサン (シクロホスファミド)	500~1000mg/m ²	点滴静注(3時間)	●				

*1クール28~56日間