

GC 療法

尿路上皮癌（術前化学療法・進行再発癌）

薬品名	投与量	投与方法	1日目	2日目	-	8日目	-	15日目	-	28日目
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注(30分間)	●			●		●		
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注(2時間)		●						

*1クール28日間 PDまで

sM-VAC 療法

尿路上皮癌(進行再発癌)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	2日目	-	-	28日目
メソトレキセート (メソリキセート)	30mg/m ²	点滴静注(2時間)	●				
エクザール (ビゾプラスチン)	3mg/m ²	静注(iv)		●			
ピノルビン (ピラルピシン)	30mg/m ²	静注(iv)		●			
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注(2時間)		●			

*1クール28日間 PDまで

M-VAC 療法

尿路上皮癌(術前化学療法・進行再発癌)

薬品名	投与量	投与方法	1日目	2日目	-	15日目	-	22日目	-	28日目
メソトレキセート (メソリキセート)	30mg/m ²	点滴静注(2時間)	●			●		●		
エクザール (ビゾプラスチン)	3mg/m ²	静注(iv)		●		●		●		
ピノルビン (ピラルピシン)	30mg/m ²	静注(iv)		●						
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注(2時間)		●						

*1クール28日間 PDまで

GEM療法

尿路上皮癌（進行再発癌）

薬品名	投与量	投与方法	1日目	-	8日目	-	15日目	-	28日目
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注(30分)	●		●		●		

*1クール28日間 PDまで

GEM+PTX療法【適応外】

尿路上皮癌（進行再発癌）

薬品名	投与量	投与方法	1日目	-	8日目	-	15日目	-	28日目
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注(30分)	●		●		●		
パクリタキセル	180mg/m ²	点滴静注(3時間)	●						

*1クール28日間 PDまで

★適応外につき患者同意取得、カルテ記載、及び特別使用申請書提出すること

パムプロリズマブ療法【3週毎】

尿路上皮癌（進行再発癌）

薬品名	投与量	投与方法	1日目	-	-	-	21日目
キイトルーダ (パムプロリズマブ)	200mg/body	点滴静注(30分間)	●				

*1クール21日間 PDまで

ペムブロリズマブ療法【6週毎】

尿路上皮癌（進行再発癌）

薬品名	投与量	投与方法	1日目	—	—	—	42日目
キイトルーダ (パムブロリズマブ)	400mg/body	点滴静注(30分間)	●				

* 1クール42日間 PDまで

2021.1